


Werkinstructie

Hoe bied ik de medicatie aan?



Welk soort voor mijn patiënt?

Soort	Smaak	Zoetstof	IDDSI levels	Specifieke patiëntengroep
	Vanille	Suiker (10%)	 Extremely thick Kwarkdikte	O.a. bij zware dysfagie
	Aardbei/Banaan	Suiker (10%)	 Moderately thick Yoghurtdikte	95% vd patiënten
	Framboos	Xylitol	 Moderately thick Yoghurtdikte	95% vd patiënten, tevens diabetici

Gebruiksaanwijzing:

- Laat de patiënt eerst Gloop proeven zonder medicatie;
- Begin met 1 tablet en breid dit eventueel uit naar meerdere tabletten per inname;
- Leg tablet(ten) op een eetlepel;
- 5 ml Gloop (1 pomp = 5 ml) er bovenop;
- Bied dit in zijn geheel aan;
- Er mag na inname met Gloop een glas water genomen worden, maar dit is niet noodzakelijk.

(Vermaalde medicatie kan tevens met Gloop ingenomen worden)



Rushwood BV
 Ottergeerde 30, 4941 VM Raamsdonksveer
 088 8001400 | info@rushwood.eu | www.gloop.eu

Als medicatie slikken met water geen optie is

 **Medicatie slikgel**

Voor veilige inname van medicatie



Probeer te vermijden:

Gebruik van fruitsappen/appelmoes voor medicatie inname:

- * Vezels hebben een negatieve impact op een aantal medicijnen [1,2,3,4].
- * Bioflavonoïden in fruit hebben een negatieve impact op bepaalde medicijnen [5].



Gebruik van melkproducten voor medicatie inname:

- * Vermindert de werking van veel medicijnen [6] .
- * Vermindert de opname van specifieke medicatie [6].



Vermalen van medicatie/Openen van capsules:

- * Kan stabiliteit en effectiviteit van medicatie verminderen en de toxiciteit verhogen [7].
- * Verhoogd risico op gezondheidsproblemen voor zorgprofessionals met een toename van toxische effecten door inademing en opname via de huid [7].



Gebruik van voedselverdikkers:

- * Vermindert drastisch de absorptie van verschillende medicijnen [8].
- * Xanthaangom en Guargom hebben een grote impact op absorptie van medicatie [9].



De veilige keuze:

Gloup:

- * Gepatenteerde formule.
- * Op meerdere manieren onderzocht door The University of Queensland (UQ)/ School of Pharmacy Brisbane/Australië [10,11].
- * Vermindert behoefte aan vermalen tot wel 40% [10].
- * Queensland University classificeert Gloup Original en Zero als IDDSI level 3 (kamertemperatuur) en Level 4 (uit koelkast), Gloup Forte altijd IDDSI level 4 [11].
- * Onafhankelijke survey: Ervaringen met het gebruik van Gloup: Gebruik van Gloup: 48% groot gebruiksgemak, 34% minder vermalen en 33% verhoogde therapietrouw [10].



1. McCabe-Sellers B., Frankel E.H., Wolfe J. "Handbook of Food-Drug Interactions." Boca Raton, FL: CRC Press. 2003; 12: 262-266.

2. Gaby AR, Batz F, Chester R, et al. A-Z Guide to drug-herb-vitamin interactions. Revised and expanded 2nd edition. Three Rivers Press. 2006. ISBN: 03-07336-64-6

3. Liel Y, Harman-Boehm I, Shany S. Evidence for a clinically important adverse effect of fiber-enriched diet on the bioavailability of levothyroxine in adult hypothyroid patients. J Clin Endocrinol Metab. 1996 Feb;81(2):857-9. PMID: 8636317

4. Moreyra AE, Wilson AC, Koraym A. Effect of combining psyllium fiber with simvastatin in lowering cholesterol. Arch Intern Med. 2005 May 23;165(10):1161-6. PMID: 15911730

5. Lilja, J.J., Juntti-Patinen, L. & Neuvonen, P.J. Orange juice substantially reduces the bioavailability of the beta-adrenergic-blocking agent celiprolol. Clin.Pharmacol. Ther. 75, 184-190 (2004).

6. Food-Drug Interactions Rabia Bushra, Nousheen Aslam, Arshad Yar Khan Rabia Bushra Nousheen Aslam College of Pharmacy Ziauddin college of Pharmacy, Ziauddin University, Karachi, Pakistan. E-mail: rabia_pharmacist@hotmail.com Arshad Yar Khan Dept. of Chemistry University of Karachi, Pakistan. Received: 17 Oct 2010 / Accepted: 09 Dec 2010 © OMSB, 2011

7. SHPA Carol simmons, medicines information pharmacist, Fremantle Hospital and health service, WA. Article don't rush to crush.

8. Crushed Tablets: Does the Administration of Food Vehicles and Thickened Fluids to Aid Medication Swallowing Alter Drug Release? Yady J. Manrique1, Danielle J. Lee1, Faiza Islam1, Lisa M. Nissen1,2 , Julie A.Y. Cichero1, Jason R. Stokes3, Kathryn J. Steadman1 1 School of Pharmacy, The University of Queensland, Brisbane, Qld 4072, Australia. Published, May 1, 2014

9. Thickening agents used for dysphagia management: effect on bioavailability of water, medication and feelings of satiety. Julie AY Chichero Nutritional Journal 2013 12:54, DOI:10.1186/1475-2891-12-54.

10. Marwa O. Malouh, Julie Chichero; APSA Abstract 2019 Experiences with using Gloup® medication lubricant: What do Australian aged care facility workers think?

11. Marwa A. Malouh 1, Julie A.Y. Cichero. Are Medication Swallowing Lubricants Suitable for use in Dysphagia? Consistency, Viscosity, Texture, and Application of the International Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) Framework. School of Pharmacy, The University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia. Received: 20 August 2020; Accepted: 27 September 2020; Published: 28 September 2020 Pharmaceutics.

Waarom?

Omdat voedsel niet de beste keuze is om medicatie te slikken is Gloup ontwikkeld.

Gloup is een medisch hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met innemen van orale medicatie. Het is een glibberige gel die de pil omhult en ervoor zorgt dat het geheel makkelijk weg slikt.

Gloup maskeert de bittere smaak van de medicatie en heeft geen impact op de effectiviteit van de medicatie.

Gloup is een geregistreerd medisch hulpmiddel klasse I, ontwikkeld en verbeterd in samenwerking met diverse universiteiten.



Smaak: Vanille
Zoetstof: 10% suiker
Ingrediënten: 100% natuurlijk
IDDSI level: 4 Extremely thick kwarkdikte
Verkrijgbaar in: 500 ml fles
8 ml stickpacks per 25 stuks



Smaak: Aardbei/Banaan combinatie
Zoetstof: 10% suiker
Ingrediënten: 100% natuurlijk
IDDSI level: 3 Moderately thick yoghurt dikte
Verkrijgbaar in: 500 ml fles, 150ml en 75 ml tube
8ml stickpacks per 25 stuks



Smaak: Framboos
Zoetstof: Xylitol
Ingrediënten: 100% natuurlijk
IDDSI level: 3 Moderately thick yoghurt dikte
Verkrijgbaar in: 500 ml fles, 150ml en 75 ml tube
8ml stickpacks per 25 stuks

